



НАУЧНИ ИНСТИТУТ
ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

АМДОПАРВОВИРУС КОД ПАСА

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ КОД ДОБЕРМАНА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2026.

У 2026. години у Републици Србији потврђен је случај инфекције амдопарвовирусом код добермана. Овај налаз указује да је реч о вирусу који треба укључити у диференцијалну дијагностику код паса са неспецифичним, продуженим или системским клиничким знацима болести.



У Републици Србији је 2026. године потврђен случај амдопарвовируса код добермана.

Овај налаз има дијагностички и епизоотиолошки значај и указује на потребу за даљим праћењем и тестирањем сумњивих случајева.



ВИРУС

Амдопарвовирус је вирус из породице Parvoviridae, рода *Amdoparvovirus*. Одликује се потенцијалом да изазове перзистентну инфекцију и различите знакове болести, због чега може остати недијагностикован уколико се не уврсти у циљану лабораторијску дијагностику.



ПРЕНОС

Инфекција се преноси директним контактом, као и индиректно преко људи, опреме и површина средине. Вирусни геном је утврђен у крви, урину, различитим органима и другим ткивима. Иако механизми преноса нису у потпуности познати, контакт са инфицираним животињама и контаминираним средином може представљати ризик од преноса.



КЛИНИЧКИ ЗНАКОВИ БОЛЕСТИ КОД ПАСА

- смањена активност / летаргија
- губитак апетита
- мршављење и лоша кондиција
- повишена телесна температура
- гастроинтестинални поремећаји
- увећање лимфних чворова
- промене општег здравственог статуса животиње
- напади
- изменени параметри биохемијског налаза крви, укључујући повишене ензиме јетре



ЕПИЗООТИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- инфекција може протичати са неспецифичним и различитим клиничким знацима болести
- вирус може бити превелик уколико се не укључи у диференцијалну дијагностику
- потврђен случај код добермана у Републици Србији указује на значај активног надзора и лабораторијске дијагностике
- присуство вируса код паса има значај за клиничку праксу, дијагностику и даље епизоотиолошко праћење



ПОСЛЕДИЦЕ

- погоршање општег здравственог статуса животиње
- продужен и нејасан ток болести
- потреба за додатним клиничким и лабораторијским испитивањима
- могућност погрешне или непотпуне дијагнозе ако се вирус не тестира
- одлагање адекватне процене случаја и праћења тока болести



ЗАШТО ТЕСТИРАТИ?

- клинички знакови болести могу бити неспецифични
- инфекција може указивати на друге вирусне, бактеријске, паразитске или имуно-посредоване болести
- потврда инфекције је важна за правилну диференцијалну дијагнозу
- лабораторијска потврда омогућава поузданију клиничку интерпретацију случаја
- тестирање доприноси бољем разумевању присуства и значаја овог вируса у популацији паса у Србији



ДИЈАГНОСТИКА

Молекуларна метода (PCR / real-time PCR и секвенцирање) омогућава поуздану детекцију вируса и потврду инфекције.



УЗОРЦИ

- крв (EDTA)
- по потреби и други узорци, у зависности од клиничких знакова болести и доступног материјала



Молекуларно испитивање врши се у Научном институту за ветеринарство Србије (НИВС).

За више информација консултовати НИВС.



www.nivs.rs



Научни институт за ветеринарство Србије
Јаниса Јанулиса 14, Београд, Србија



nivs@nivs.rs

